

CISTOSCOPIA

RECOMENDACIONES



La cistoscopia es un examen visual directo de la uretra y el revestimiento de la vejiga con un instrumento similar a un microscopio. Esto toma solo unos minutos y generalmente se puede realizar en nuestras oficinas con anestesia local. El cistoscopio se lubrica y se inserta suavemente en la abertura urinaria natural. Por lo general, no es doloroso, pero a menudo hay una leve molestia durante el procedimiento.

1. Es posible que note orina teñida de sangre o que sienta una leve molestia al orinar después de la cistoscopia. Esto es normal y generalmente se resuelve dentro de dos o tres días. No continúe tomando aspirina, anticoagulantes o medicamentos antiinflamatorios durante al menos tres días después de la cistoscopia (o como lo indique su médico de cabecera).
2. Aconsejamos aumentar la ingesta de líquidos durante varios días después de la cistoscopia, especialmente si hay sangre visible en la orina. Si debe restringir su ingesta de líquidos por razones médicas, comuníquese con su médico de cabecera para obtener asesoramiento específico.
3. En ciertos casos, el urólogo puede recetarle antibióticos antes y / o después de este procedimiento. Si se recetan antibióticos, asegúrese de terminar todos los medicamentos según las indicaciones, incluso si se siente bien.

1. Si es alérgico a algún medicamento, tiene antecedentes de infecciones frecuentes de orina o necesita tomar antibióticos antes de someterse a un tratamiento dental, notifique a su médico o enfermera. En algunos casos, se pueden requerir antibióticos adicionales antes de la cistoscopia.
2. Este procedimiento no se puede realizar de forma segura si tiene una infección del tracto urinario. El urólogo puede ordenar un análisis de orina y un cultivo de orina si no se han realizado recientemente. Estas pruebas deben realizarse antes de su cita. **TENGA EN CUENTA:** Si su urólogo ha ordenado análisis de orina antes de la cistoscopia, debemos tener los resultados completos antes de realizar la cistoscopia. Si las pruebas indican que tiene una infección, su urólogo se lo notificará y le recetará antibióticos. Es posible que también sea necesario cambiar la cita para la cistoscopia si este es el caso.
3. Si toma aspirina, medicamentos antiinflamatorios (como Motrin, Alleve, Vioxx, Celebrex, etc.) o cualquier anticoagulante (como Coumadin o Plavix). Es posible que deba suspender temporalmente estos medicamentos antes de la cistoscopia. Si no está seguro, revise sus medicamentos con su médico o enfermera. Si otro médico le recetó estos medicamentos, debe comunicarse con ellos antes de dejar de tomarlos. Si no pueden ser interrumpidos de manera segura, comuníquese con nuestra oficina antes de ingresar.